PREVALÊNCIA DE ARRITMIA CARDÍACA EM PACIENTES COM SÍNDROME DA APNÉIA HIPOPNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO NO MUNICÍPIO DE ERECHIM

Daniel André Ragievicz¹, Fernanda Duarte de Andrade²

Resumo

Objetivo: Verificar a prevalência de arritmias cardíacas nos prontuários de pacientes que realizaram o exame de polissonografia, bem como traçar o perfil destes.

Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo de caráter transversal, retrospectivo. Foram analisados prontuários de pacientes com diagnóstico de. Nosso estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da URI Campus de Erechim-RS.

Resultados: Identificamos 92 indivíduos que se enquadraram em nossos critérios de inclusão e exclusão. Observou-se alteração do traçado eletrocardiográfico em apenas 5 destes pacientes. Em relação ao sexo 61 indivíduos são do sexo masculino. Encontramos uma média em relação à idade de 55,7 anos, a média do índice de massa corporal foi de 29,67 kg/m², a média da Escala de Sonolência de Epworth foi de 7,62. **Conclusão:** Através da análise dos dados conclui-se que os dados não foram expressivos em relação as alterações no traçado eletrocardiográfico devido ao fato de os instrumentos de avaliação para tal finalidade não serem específicos para detecção de arritmias cardíacas. A maioria dos indivíduos é do sexo masculino, em uma faixa etária média e acima do peso corporal considerado normal.

Palavras-chave: SAHOS, apneia do sono, polissonografia, arritmias cardíacas, prevalência.